

Chi ha paura della tosse cattiva?



**LEI NO,
PERCHÉ HA FATTO
IL VACCINO CONTRO
LA PERTOSSE.**

QUANTO È PERICOLOSA LA PERTOSSE PER I BAMBINI PICCOLI?

La pertosse è una malattia molto seria, in particolare nel primo anno di vita. In questa fascia di età, infatti, la malattia non si presenta con attacchi di tosse ma con crisi di apnea in cui il bambino smette di respirare.

Può inoltre causare polmonite, grave insufficienza respiratoria, danni cerebrali permanenti e anche la morte. Quasi sempre i bambini colpiti dalla pertosse sotto l'anno di vita devono essere ricoverati in ospedale. La pertosse ha un andamento ciclico e periodicamente i casi aumentano in maniera preoccupante.

In Italia i decessi per pertosse sono rari, ma negli ultimi anni è stato registrato un aumento di casi che ha portato ad alcuni decessi.

COME PROTEGGERSI?

La vaccinazione contro la pertosse è il metodo più efficace per evitare di contrarre la malattia

COME SI TRASMETTE LA PERTOSSE?

La pertosse è una malattia altamente contagiosa e si diffonde da persona a persona con gli starnuti, la tosse e in situazione di condivisione dello spazio di respiro, ad esempio quando il neonato sta sul petto della mamma. Gli adulti e i bambini più grandi con la pertosse spesso presentano sintomi non tipici che possono essere scambiati per comuni raffreddori con tosse. Per questo è consigliabile verificare lo stato vaccinale delle persone che si occuperanno del proprio bambino da vicino.

.....

Puoi iniziare a proteggere il tuo bambino dalla pertosse ancora prima che nasca, vaccinandoti nel terzo trimestre di gravidanza

.....

PERCHÉ È IMPORTANTE FARE LA VACCINAZIONE DURANTE LA GRAVIDANZA?


Il vaccino contro la pertosse è raccomandato durante il terzo trimestre della gravidanza. In questo modo la mamma produce anticorpi che passano al bambino attraverso la placenta prima della nascita. Questi anticorpi lo proteggeranno nei primi mesi di vita, finché non avrà ricevuto le prime due dosi di vaccino e comincerà a produrre i propri anticorpi.

COME SI CHIAMA IL VACCINO CONTRO LA PERTOSSE?

Il vaccino da eseguire è quello contro difterite-tetano-pertosse [acellulare] (dTpa) che conferisce la protezione verso tutte e tre queste malattie. Non esiste un vaccino monovalente contro la sola pertosse.

CHE COS'È IL COCOONING?

Il Cocooning, o strategia del bozzolo, è una protezione indiretta del bambino. Consiste nell'assicurarsi che **tutti coloro che circondano il neonato siano vaccinati contro la pertosse e abbiano effettuato un richiamo del vaccino di recente**. Il Cocooning potrebbe non essere sufficiente a prevenire il contagio e la malattia, ma ne riduce il rischio.



SE HO GIÀ FATTO QUESTA VACCINAZIONE, È NECESSARIO CHE IO LA RIPETA?

Sì, poiché gli anticorpi indotti dalla vaccinazione raggiungono la quantità massima dopo circa 2 settimane e iniziano successivamente a diminuire. Il vaccino è pertanto raccomandato per ciascuna gravidanza, in modo che ogni neonato abbia la massima protezione possibile.

SE HO GIÀ AVUTO LA PERTOSSE IN PASSATO, DEVO FARE COMUNQUE LA VACCINAZIONE?

Sì, perché a differenza delle altre malattie infantili, l'immunità data dalla malattia non è perenne, ma si riduce progressivamente nel tempo.

IL VACCINO È SICURO PER LA MAMMA E PER IL BAMBINO?

Sì. Il vaccino contro la pertosse è molto sicuro sia per la mamma che per il bambino. I più comuni effetti collaterali sono lievi, come rossore, gonfiore e dolore nel sito dell'iniezione e si risolvono in pochi giorni. Il vaccino non

può causare pertosse perché è un vaccino acellulare e non contiene batteri vivi. I ginecologi e le ostetriche raccomandano di vaccinarsi contro la pertosse durante il terzo trimestre di gravidanza.

Nei primi mesi di vita i bambini sono particolarmente a rischio di sviluppare forme gravi di pertosse e restano vulnerabili finché non avranno ricevuto almeno le prime due dosi di vaccinazione.

MAMMA, VACCINATI ANCHE CONTRO L'INFLUENZA!

Ricorda che, se ti trovi nel secondo e terzo trimestre di gravidanza durante il periodo dell'influenza, è molto importante vaccinarsi anche contro questa malattia! Infatti nelle donne in gravidanza l'influenza può dare gravi complicazioni alla mamma (polmoniti e difficoltà respiratorie) ma può anche essere causa di aborto, parto prematuro, anomalie congenite del feto.



PIÙ INFORMAZIONI SULLA VACCINAZIONE IN GRAVIDANZA

FOR MORE INFORMATION

POUR PLUS D'INFORMATIONS

PER ME SHUME INFORMACIONE

了解更多信息

مزید معلومات کے لیے

للمزيد من المعلومات

salute.regione.emilia-romagna.it | saperidoc.it



Non da sola

Comprendere e vivere
la propria gravidanza, insieme