

PROVA N. 1

Domande a risposta multipla

1. Il modello di trattamento del Maudsley Hospital di Londra per i DCA, risulta maggiormente efficace:

- a) se è presente un disturbo ossessivo-compulsivo in comorbidità
- b) se la durata dell'anoressia nervosa è inferiore a 3 anni
- c) se il trattamento è rivolto a giovani adulti con disturbo da alimentazione incontrollata
- d) se sono assenti in anamnesi abusi intrafamiliari

2. Secondo Anderson (1984) la salute può essere considerata come:

- a) processo
- b) potenzialità
- c) prodotto
- d) Nessuna delle precedenti

3. In riferimento alla Scala Edinburgh Postnatal Depression quale delle seguenti affermazioni è vera:

- a) È una scala diagnostica composta da 10 items
- b) Il periodo di somministrazione si situa dall'inizio alla fine della gravidanza
- c) a ogni domanda viene attribuito un punteggio da 0-4
- d) comprende due items comprendenti il rischio autolesivo

4. Secondo alcuni autori (Mumford et al. 1984; Saravay e Lavin 1994; Strain, Hammer e Fulop 1994) i principali vantaggi offerti dalla consulenza psicologica in ospedale sono stati:

- a) La riduzione dei farmaci per dormire e la diminuzione dei costi di cura
- b) La riduzione dei costi di cura e la riduzione dei costi del personale
- c) La diminuzione della durata della terapia farmacologica
- d) La riduzione della durata del ricovero e la diminuzione dei costi di cura

5. Cosa è il Comitato etico?

- a) Un organo aziendale di consultazione e di riferimento per qualsiasi problema di natura etica che si possa presentare in tutte le strutture sanitarie del territorio.
- b) Un organismo indipendente a cui il cittadino può fare riferimento per qualsiasi problematica di natura clinica.
- c) Un organismo indipendente che tutela e garantisce pubblicamente i diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche, garantendo pubblicamente questa tutela.
- d) Un collegio indipendente di garanzia della trasparenza nelle aziende ospedaliero-universitarie.

6. Secondo il DSM-5 nel disturbo da ansia da separazione, nei bambini e negli adolescenti, la paura, l'ansia o l'evitamento sono persistenti con una durata:

- a) di almeno 4 settimane
- b) di almeno 2 settimane
- c) di almeno 3 mesi
- d) di almeno 6 mesi

7. Nel DSM-5 quale dei seguenti Disturbi non fa parte dei Disturbi della comunicazione:

- a) disturbo del linguaggio
- b) mutismo selettivo
- c) disturbo fonetico fonologico
- d) disturbo della fluenza con esordio nell'infanzia

8. Chi ha introdotto nella Psicologia Sociale la distinzione tra fattori distali e prossimali di rischio:

- a) Cirillo S. e Di Blasio P. (1988)
- b) Di Blasio P. (2005)
- c) Bandura A. (1997)
- d) Baldwin et al. (1990)

9. In uno studio randomizzato che confronta un trattamento e un controllo, il motivo della randomizzazione è di:

- a) Provare ad ottenere 2 gruppi di pazienti che siano diversi rispetto ai principali fattori prognostici misurati all'inizio dello studio
- b) Facilitare l'assegnazione in doppio cieco
- c) Provare ad ottenere che i due gruppi siano simili all'inizio dello studio rispetto ai fattori prognostici noti e ignoti
- d) Nessuna delle precedenti

10. Il Gambling Iowa Task viene applicato

- a) per valutare il grado di compromissione lavorativa, economica, sociale e relazionale dei giocatori d'azzardo
- b) per valutare il grado di dipendenza nei giocatori d'azzardo
- c) per valutare la capacità di inibire una risposta automatica nei giocatori d'azzardo
- d) per valutare deficit cognitivi in pazienti con lesioni prefrontali

11. I criteri diagnostici del disturbo da ansia di malattia (300.7) secondo il DSM-5

12. Il candidato illustri i criteri di valutazione e i modelli di trattamenti diretti ai familiari di soggetti con gravi disturbi di personalità: strumenti , obiettivi e tipologie intervento , percorsi validati di riferimento.
